

Si no puedes visualizar este mail haz click aquí

RECOMENDACIÓN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES. PREDIABETES. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

**La ABA sugiere seguir las
recomendaciones de la SAD en
cuanto al uso del valor de 100
mg/dl como límite superior del
rango de referencia para glucosa
en ayunas**

HABLEMOS SOBRE PREDIABETES

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS?



GLUCEMIA EN AYUNAS
ENTRE 100 Y 125 MG/DL


Valor normal o de referencia para
glucemia en ayunas (8h) < 100 mg/dl

GLUCEMIA A LOS 120
MIN DE LA PTOG
ENTRE 140 Y 199
MG/DL



HBA1C ENTRE 5,7 Y 6,4%

**Debe ser realizada por métodos
certificados y estandarizados al
DCCT**



DATO CURIOSO #1 1 DE CADA 3 PERSONAS TIENEN PREDIABETES

DATO CURIOSO #2 DURANTE LA PREDIABETES SE ALTERA LA
PRODUCCIÓN DE INSULINA

DATO CURIOSO #3 EXISTE MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR
ENFERMEDAD RETINAL, RENAL, NEUROLÓGICA Y
CARDIOVASCULAR



PREDIABETES

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

1 GLUCEMIA EN AYUNAS ENTRE 100 Y 125 MG/DL
 Valor normal o de referencia para glucemia en ayunas (8h) < 100 mg/dl

2 GLUCEMIA A LOS 120MIN DE LA PTOG ENTRE 140 Y 199 MG/DL

3 HBA1C ENTRE 5,7 Y 6,4%

- 1 DE CADA 3 PERSONAS TIENE PREDIABETES

- DURANTE LA PREDIABETES SE ALTERA LA PRODUCCIÓN DE INSULINA

- EXISTE MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR ENFERMEDAD RETINAL, RENAL, NEUROLÓGICA Y CARDIOVASCULAR



Referencia Bibliográfica:

Comandatore V y col. Glucemia en ayunas alterada: ¿es oportuno utilizar el punto de corte en 100 mg/dl en Argentina? Recomendaciones. Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes 2023; Vol. 57 (09-19)

Maselli MC y col. Hemoglobina A1c/ Recomendaciones. Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes 2023; Vol. 57 (20-25)

¿Te gustó este mail? [Reenvíalo a un amigo.](#)